

ოჯახური ხმელთაშუაზღვის ცხელება Familial Mediterranean Fever (FMF)

დაავადების არსი

FMF — **გენეტიკური დაავადება**, რომელშიც იმუნური სისტემა პერიოდულად "ირთვება" მიზეზის გარეშე — ინვეს ანთებას, ტკივილსა და ცხელებას. ეპიზოდებს შორის პაციენტი **სრულიად ჯანმრთელად გრძნობს თავს**.

1 : 500 სიხშირე ხმელთა- შუაზღვის პოპ-ში*	12-72 სთ ეპიზოდის ხანგრძლივობა	M694V ყველაზე გავრცელ. მუტაცია
---	---	---

* სიხშირე მერყეობს 1:250-დან 1:1000-მდე ეთნიკური ჯგუფის მიხედვით

კლინიკური გამოვლინებები

ცხელება $\geq 38^{\circ}\text{C}$	მუცლის ტკივილი
ართრიტი / ართრალგია	გულმკერდის ტკივილი
ერისიპელოიდური ერითემა	CRP / ESR \uparrow

ეპიზოდის გამომწვევები — ციკლური ხასიათი

- **ციკლური სპონტანურობა** — ეპიზოდები ხშირად რეგულარული ინტერვალებით (3–4 კვირა) ვითარდება **გამომწვევის გარეშე**

მკურნალობა

კოლხიცინი — პირველი რიგი

ამცირებს ეპიზოდების სიხშირეს და **სუბკლინიკურ ანთებას** ეპიზოდებს შორის. რეგისტრაცია: **IL-1 ბლოკადა — anakinra, canakinumab** (EULAR/PReS 2016).

AA ამილოიდოზი — FMF-ის მთავარი გართულება. ქრონიკულად მაღალი SAA \rightarrow ამილოიდის დეპოზიცია თირკმელებში. **კოლხიცინი ამ პროცესს მნიშვნელოვნად ამცირებს**, მათ შორის ასიმპტომურ ეტაპზეც.

დიაგნოზი ეფუძნება **კლინიკური სურათის შეფასებას** და შესაბამისი კვლევების ჩატარებას. საჭიროების შემთხვევაში ტარდება **გენეტიკური კვლევა** მუტაციის დასადასტურებლად.

ალ. ყაზბეგის გამზირი N9
032 293 10 00; 599 93 10 00



მირევი
სამედიცინო ცენტრი
— ღიააბის აპული —