მრჩეველი
საბავშვო ცენტრი
ღიმბახის ბაგუში

PFAPA

პერიოდული ცხელება • აფთოზური წყლულები • ფარინგიტი • ადენიტი

რა არის PFAPA?

PFAPA აუტოანთებითი დაავადებაა და ყველაზე გავრცელებული პერიოდული ცხელების სინდრომია ბავშვებში.

ბავშვები ეპიზოდებს შორის სრულიად ჯანმრთელები არიან და ნორმალურად იზრდებიან.

ვის ემართება?

2–5	**10**	**2–8**	**4–5**
წლის ასაკში იწყება	წლამდე წყდება	კვირაში ერთხელ	დღე გრძელდება
უმეტეს შემთხვევაში	პაციენტთა უმეტესობაში	ეპიზოდები მეორდება	თითოეული ეპიზოდი

ძირითადი სიმპტომები

ცხელება	აფთოზური წყლულები	ფარინგიტი	ადენიტი
38.5–41°C	პაციენტთა 40–80%-ში	პაციენტთა 65–100%-ში	პაციენტთა 60–100%-ში

სხვა ხშირი სიმპტომები ეპიზოდის დროს:

მუცლის ტკივილი (40–65%) • სახსრების ტკივილი (11–42%)
ღებინება (18–41%) • თავის ტკივილი (18–65%)

დიაგნოსტიკა

კლინიკური კრიტერიუმები

- ✦ 4+ სტერეოტიპული ეპიზოდი
- ✦ რეგულარული 2–8 კვირიანი ინტერვალი
- ✦ ფარინგიტი, ადენიტი ან წყლულები
- ✦ ნორმალური ზრდა ეპიზოდებს შორის
- ✦ სპეციფიური ლაბ. ტესტი არ არსებობს

გამოირიცხა პერიოდული ცხელებით მიმდინარე სხვა დაავადებები

სტეროიდის ტესტი

პრედნიზოლონი 1–2 მგ/კგ პერორალურად ეპიზოდის დაწყებისას — ცხელება ქრება რამდენიმე საათში.

პასუხი სტეროიდზე →
PFAPA-ს მაღალი ალბათობა

პასუხის არარსებობა → სხვა დიაგნოზი

მკურნალობა

ეპიზოდური მკურნალობა	პროფილაქტიკა	ტონზილექტომია	კარგი პროგნოზი
ეპიზოდის მოსახსნელად პრედნიზოლონი 1–2 მგ/კგ	ცემეტიდინი ან კოლხიცინი	ქირურგიული მეთოდი ეფექტური უმრავლესობაში	თვითლიმიტირებადი გრძელვადიანი გართულება არ ახასიათებს

კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ პედიატრ რევმატოლოგს

ალ. ყაზბეგის გამზირი N9
032 293 1 0 00: 599 93 10 00

მრჩეველი
საბავშვო ცენტრი
ღიმბახის ბაგუში