


სქესობრივი გზით გადაედი ინფექციები STI - PCR

მასალა: ცერვიკალური ნაწხი

კონტეინერი: სტერილური ჩხირი (მედუმი გარეშე)



ნაწხის აღების წესი:

მასალის აღებამდე ნეიგჰადუხი ჩხირის საშუალებით საშვიდოსნოს ყელის ზედაპირიდან ფხთხიდად მოაცილეთ ზედმეტი დოზა (ეს ჩხირი გადააგდეთ)

- მოახდინეთ კონტეინერზე მარკირება წინასწარ;
- ამოიღეთ მასალის ასაღები ჩხირი კონტეინერიდან;
- მოათავსეთ ჩხირი ენდოცერვიქსში და წრიული მოძრაობით აიღეთ ნაცხი;
- დააბრუნეთ ჩხირი კონტეინერში;
- გამოაგზავნეთ კონტეინერი ლაბორატორიაში კვლევისთვის.

მასალა სტაბილუხია: 2 საათი 15-30 °C; 24 საათი 2-8 °C

მასალა: დიდის პირველი შარდი

კონტეინერი: შარდის სტერილური კონტეინერი



შარდის შეგროვების წესი:

- შარდის შეგროვებამდე არ უნდა ჩაიტაროთ ჰიგიენური პროცედურა;
- მოხადეთ სახურავი შარდის კონტეინერს ისე, რომ არ შეეხოთ ხელით კონტეინერის შიდა ზედაპირს;
- შარდის პირველი ულუფა 10-20 მლ მოათავსეთ კონტეინერში;
- შარდის შეგროვების შემდეგ კონტეინერს მჭიდროდ დაახურეთ სახურავი;
- შარდი უნდა მოიტანოთ ლაბორატორიაში აღებიდან 2 საათის განმავლობაში;
- თუ 2 საათის განმავლობაში ვერ ახერხებთ შარდის მოტანას ლაბორატორიაში, შარდის შენახვა შესაძლებელია მაცივარში 2-8°C ტემპერატურაზე, 48 საათის განმავლობაში.