

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები STI

მასალის ასაღები წესი

STI კვლევები:

- ტრიქომონა ვაგინალის
- ურეაპლაზმა ურეალიტიკუმ/ურეაპლაზმა პარვუმ
- მიკოპლაზმა ჰომინის / მიკოპლაზა გენიტალიუმ
- კანდიდა ალბიკანს / გარდნერელა ვაგინალის
- ადამიანის პაპილომა ვირუსი DNA (დაბალი რისკი) ტიპი 6/11
- ადამიანის პაპილომა ვირუსი DNA (მატალი რისკი) სკრინინგი
- სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები STI (დიდი პანელი)
- სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები STI (მცირე პანელი)

მასალა: დილის პირველი შარდი

კონტეინერი: შარდის სტერიული კონტეინერი

შარდის შეგროვების წესი:

- შარდის შეგროვებამდე პაციენტმა არ უნდა ჩაიტაროს ჰიგიენური პროცედურა.
- მოხადეთ სახურავი შარდის კონტეინერს.
- არ შეეხეთ ხელით კონტეინერის შიდა ზედაპირს.
- შარდის პირველი ულუფა 10-20 მლ მოათავსეთ კონტეინერში.
- შარდის შეგროვების შემდეგ კონტეინერს მჭიდროდ დაახურეთ სახურავი.
- შარდი უნდა მოიტანოს ლაბორატორიაში ადებიდან 2 საათის განმავლობაში.
- თუ 2 საათის განმავლობაში ვერ ახერხებთ შარდის მოტანას ლაბორატორიაში, შარდის შენახვა შესაძლებელია მაცივარში 2-8°C ტემპერატურაზე, 48 საათის განმავლობაში.